Hesperorner

Hesperorner är en utdöd och mycket specialiserad klad av tandade fåglar från sen krita som återfanns i havs- och sjöbiotoper på norra halvklotet och som omfattade släktena *Hesperornis*, *Parahesperornis*, *Baptornis*, *Enaliornis*, och förmodligen även *Potamornis*. De var vattenlevande, skickliga simmare, levde av rov och flertalet, kanske alla, var flygoförmögna. Den största arten, beskrevs 1999 och har namnet *Canadaga arctica*, kan ha nått en maximal adult längd på över 1,5 meter.

Hesperornerna dog ut i och med K/T-utdöendet, tillsammans med fågelkladen Enantiornithes, alla icke-fågeldinosaurier och många andra livsformer.

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Hesperornithes (https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperornithes), 22 juni 2008 (https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperornithes&oldid=216342425).

Hesperorner

Stratigrafisk utbredning: Sen Krita

Hesperornis

Systematik

Domän	Eukaryoter Eukaryota
Rike	Djur Animalia
Stam	Ryggsträngsdjur Chordata
Understam	Ryggradsdjur Vertebrata
Klass	Fåglar Aves
Underklass	 Fürbringer, 1888
Ordning	**Hesperornithiformes** Sharpe 1899

Familjer

Enaliornithidae
Baptornithidae

Hesperornithidae

Synonymer

Odontornithes (Marsh, 1873) (*partim*)
Odontolcae (Marsh, 1875)

Gaviomorphae (Cracraft, 1982) (*partim*)

Hitta fler artiklar om fåglar med

Fågelportalen

Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hesperorner&oldid=47922829"

Sidan redigerades senast den 5 juli 2020 kl. 00.39.

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor.